

RUGSĖJO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2025 09 01 - 2025 09 30



Gyvensenos medicinos specialistas
Vytautas Vasiliauskas
mob. +370 698 49092

KĄ DARYTI, KAI SKAUDA GERKLĘ

Gerklės skausmas ir perštėjimas dažniausiai yra vieni iš pagrindinių peršalimo simptomų. Kvėpavimo takų infekcijas sukelia virusai, bakterijos ar grybeliai burnos ir ryklės srityje bei bronchuose. Infekcija gali pažeisti ryklės gleivinę: faringitas, kai skausmas atsiranda arba sustiprėja ryjant; gerklas: laringitas, kai yra balso stygų uždegimas, stiprus skausmas gerklėje, intensyviai išsiskiriantis sekretas ir dažnai pasitaikantis užkimimas; migdolus: tonzilitas arba angina, kai yra pūlingas gomurio migdolų uždegimas, staiga pakyla temperatūra ir pradeda skaudėti galvą bei gerklę. Tokiais atvejais bendras pasveikimas priklauso nuo organizmo imuninės sistemos veiklos. Šį sveikimo procesą galima paspartinti, tik visas priemones reikia pradėti taikyti pajutus vos pirmus simptomus. Skaudant gerklę rekomenduoju:

- pasiilsėti, išsimiegoti, daugiau gulėti, vengti stresų;
- saugoti kojas, kad nesusaltų ir nesuslaptų, jas nuolat laikyti šiltai, būti su vilnonėmis kojineis (ir miegant); galima ant pėdų lipinti šildančius pipirinius pleistrus;
- saugoti gerklę ir ją nuolat laikyti šiltai, kad nesusaltų ir miegant); ypač tinka vilnonis šalikas ir kaklo patepimas šildomaisiais tepalais su eteriniu aliejumi;



6²⁹ €



NEO-ANGIN 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg, N24

NEO-ANGIN BE CUKRAUS 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, N24

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje kietojoje pastilėje yra: neo-angin - 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,90 mg levomentolio; neo-angin be cukraus - 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,72 mg levomentolio. Indikacijos. neo-angin sukelia vietinį mikrobų naikinantį ir skausmą malšinantį poveikį. 2,4 dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis pasižymi dezinfekuojančiomis, levomentolis – šaldančiomis ir skausmą malšinančiomis savybėmis. neo-angin kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugę žmonės, paaugliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2-3 valandas turi lėtai sučiulpti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, neo-angin vartoti ilgiau nei 3-4 dienas negalima. Kontraindikacijos. Alergija bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti neo-angin. Reklamos teksto parengimo data 2022.08.02

7⁹⁹ €



JUNIOR-ANGIN 24 pastilės gerklei

Medicinos priemonė

Su Islandine kerpena, braškių skonio

junior-angin pastilės gerklei apsaugo burnos ir gerklės gleivinę, ypač esant gerklės skausmui. Čiulpiant pastilę, sudėtyje esanti Islandinė kerpena suformuoja plėvelę, kuri padengia burnos ir gerklės gleivinę taip ją apsaugodama. Taip pat, čiulpiant pastilę, aktyvios pastilės medžiagos yra tolygiai paskirstomos ant burnos ir gerklės gleivinės. Kitos sudėtyje esančios medžiagos, t.y. cinkas ir pantotenas, puoselėja ir apsaugo gleivinę. Suaugusiems ir vaikams nuo 4 metų.

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt



Pasiūlymai galioja 2025 m. rugsėjo 1 - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvtk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvtk.lt.

- nuolat drėkinti pažeistas gleivines: gerti daug šiltų, tačiau ne karštų skysčių (ypač tinka čiobrelių, debsylo, eukalipto, imbiero, islandinės kerpenos, medetkų, pušų pumpurų, ramunėlių, rozmarinų, šalavijų, šėivamedžių, aviečių, liepžiedžių ir kitos vaistažolių arbatos, galima gerti šiltą vandenį su citrinų sultimis, t.p. su medumi sumaišytas išspaustas svogūnų ar juodojo ridiko sultis;
- dažnai (geriausiai kas 2 val.) skalauti gerklę šiltu vandeniu (stiklinėje šilto vandens ištirpinti vieną arbatinį šaukštelį valgomosios druskos, pusę šaukštelio geriamosios sodos, galima dar 5-7 lašus spir. jodo), tinka ir kojų 15 min. mirkymas taip paruoštame šiltame vandenyje arba šiltame vandenyje su garstyčiomis (ypač tinka prieš miegą).
- dezinfekuoti gerklės ir ryklės sritis, malšinti uždegimą ir skausmą dažnai čiulpiant pastiles (iš jv.vaistinių augalų ekstraktų ar iš propolio), atliekant inhaliacijas ar naudojant gerklės purškalus, kurie pasižymi pasižymi vienu ar keliais iš šių poveikių: antiseptiniu, uždegimą mažinančiu ir/ar skausmą malšinančiu; visa tai svarbu vartoti po valgio (po to patariama mažiausiai pusę valandos nevalgyti ir negerti) ar prieš miegą, kad ilgiau išliktų poveikis;
- rekomenduojama valgyti česnakų ir svogūnų, tačiau ligos pradžioje geriau vartoti virtus, mirkytus arba sutrintus su medumi, o sumažėjus gleivinių uždegiminiam procesui tinka ir žalio česnako skiltelė ar gabaliukas svogūno, tik vartoti reikia po valgio, stipriai sukramtant ir gausiai užsigeriant šiltu vandeniu;
- kuo mažiau kalbėti ir vengti kvėpuoti per burną (nes tai sukelia burnos sausumą);
- vengti gerklės dirgiklių, kurie pažeidžia burnos gleivinę,- rūkymo, cigarečių dūmų, alkoholinių gėrimų, aštrių prieskonių ir kito maisto (pvz. pipirų);
- valgyti dažnai, bet negausiai, tačiau per prievartą nevalgyti, jeigu nėra apetito; kiekvieną kąsnį gerai sukramtyti, kad gerai suvilgytą seilėmis būtų lengviau nuryti, netraumuojant uždegimo pažeistos gleivinės; valgyti sriubų, košių ir kt. skystoko neaštraus šilto maisto, ypač paskaninto augaliniu aliejumi; vietoj pieno geriau tinka rauginati pieno produktai; atsisakyti kietų sausainių, traškučių ir kitokio gerklę dirginančio bei „draskančio“ maisto.

Jeigu skauda gerklę, tai yra tikimybė, kad toks žmogus gali užkrėsti ir aplinkinius. Todėl reikia su juo apriboti kontaktą. Nesidalyti tais pačiais indais, kuo dažniau plautis rankas. Visada reikia kreiptis į gydytoją, jeigu atsiranda aukšta temperatūra, darosi sunku kvėpuoti, ryjant labai skauda gerklę, po 3 dienų gydymo simptomai neatsilūgsta arba būklė dar pablogėja. Tai padės išvengti galimų pavojingų komplikacijų.

Linkiu Jums sveikatos!



NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



- IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2 78 €
- IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4 26 €
- IBUPROM, 400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3 37 €
- IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4 96 €
- IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 4 17 €
- IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 6 52 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. Specialūs spėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29.

8 59 €

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĘ.



IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjusio buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs spėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sistetine raudonąja vilklige, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirozės apykaitos sutrikimas, dehidracija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

8 77 €

„INOVOX“. EFEKTAS –
JAU PO 1 MINUTĖS



INOVOX MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigėriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

HERBION 35 mg kietosios pastilės

6 57 €



Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausio ekstrakto (5–7,5:1). Terapinės indikacijos: Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atskosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė 6–11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilę lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gebenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai: Jei pasireškia dispnėja (dusulys), karščiavimas arba atkosima pūlinių skrepliai, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulių slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometoranas, nerekomenduojama. Gastritui ar skrandžio opaligė sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.

HERBION 7 mg/ml sirupas

6 85 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helix L., folii (gebenių lapų) sausio ekstrakto (5–7,5:1). Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atskosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. Suaugę žmonės, senyvi, 12 metų paaugliai ir vyresni. Du kartus per parą gerti 57,5 ml sirupo (atitinka 70105 mg gebenių lapų sausio ekstrakto paros dozė). 6–12 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebenių lapų sausio ekstrakto paros dozė). 2–5 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebenių lapų sausio ekstrakto paros dozė). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Aralaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. 24 metų vaikui nuolatini ar pasikartojanti kosulių galima pradėti gydyti tik nustatius medicininę diagnozę. Jei pasireškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pūlinių skrepliai, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulių slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometoranas, nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-21.

-30%

SAUSAM, DIRGINANČIAM KOSULIUI

HERBISLAND 6 mg/ml sirupas

Medicinos priemonė

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto.

Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus:

- sausam, dirginančiam kosuliui;
- užkimimui;
- gerklės skausmui.

Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.

Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus.

Be cukraus (j sudėtyje įeina natūralios kilmės sorbitolis) Malonaus citrinų skonio.

Kaip vartoti Herbisland?

1–4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) X 4 k./d.
4–10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) X 4 k./d.
10–16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą.

Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.



8 10 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA

SEPTABENE, 3 mg/1 mg, kietosios pastilės N16

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Eukaliptų skonio / Citrinų ir šėvamedžio skonio / Citrinų ir medaus skonio



Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji: rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val.; 6–12 m. vaikai: rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-27.

9 49 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA

SEPTABENE 1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalkas 30 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti:

- jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;

- sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu);

- prieš dantų traukimą ir po jo.

Dozavimas suaugusiems. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3–5 kartus per parą. 6–12 metų vaikams. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3–5 kartus per parą. Kontraindikacijos ir specialieji perspėjimai. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.



SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml nosies purškalkas (suaugusiems)

5 27 €

SEPTANAZAL 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalkas (vaikams)

5 27 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šausis (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai. Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistiniais preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama didinto kampos glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija.





COLDREX HotRem 750 mg/10 mg/60 mg, N5 **5,52 €**

COLDREX HotRem 750 mg/10 mg/60 mg, N10 **8,85 €**

COLDREX MaxGrip 1000 mg/10 mg/40 mg, N5 **5,52 €**

COLDREX MaxGrip 1000 mg/10 mg/40 mg, N10 **8,85 €**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas: suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol mišinys išsities. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. Dozavimas. Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 pakelį kas 4-6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 4 pakeliai per 24 val. COLDREX HotRem LEMON, COLDREX HotRem HONEY & LEMON: Didžiausia paros dozė: 5 pakeliai per 24 val. COLDREX MAXGRIP LEMON; COLDREX MaxGrip MENTHOL & BERRIES: Didžiausia paros dozė: 4 pakeliai per 24 val. Specialus išėjimas. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo. Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujospaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždarą kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trankiklius antidepresantus, betablockatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reikiamos teksto parengimo data: 2025-02-14

COLDREX tabletės 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, N12 **5,52 €**

COLDREX tabletės 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, N24 **8,45 €**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Dozavimas: suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, sveriantiems daugiau nei 54 kg gerti po 2 tabletes kas 4-6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12-16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43-54 kg gerti po vieną tabletę kas 4-6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 4 tabletės per 24 val. Nevartoti dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vartojimo būdas: nuryti tabletes nekrumtydami, užgeriant reikiamu skysčiu kiekiu. Specialūs išėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Coldrex, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga. Jeigu pajutote metabolinės acidozės simptomų derinį nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra kofeino. Vaisto vartojimo metu nevartokite kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pasitarkite su gydytoju, jeigu vartojate kitų vaistų. Vartojant šio vaisto negalima gerti alkoholinių gėrimų. Nepatartina vairuoti ir valdyti mechanizmų, jei pasireiškia galvos svaigimas. Sudėtyje yra natrino ir dažiklio saulėlydzio geltonojo (E110). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujospaudimas ar skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždarą kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trankiklius antidepresantus, betablockatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg. Informacija sutrumpinta! Reikiamos teksto parengimo data: 2023-10-11

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



„VIRONOX“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. **„Stiprus imunitetas+“** – organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Siekiantiems greičiau atgauti jėgas – **„Jėgoms atstatyti+“**. Ženšenis padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį. Normalią raumenų funkciją ir kaulų būklę padeda palaikyti eukaliptų ekstraktas, o vaistiniai čiobreliai – normalią imuninės sistemos veiklą ir kvėpavimo sistemos funkciją. Vartojimas: 1 pakelėlis per dieną. Balzamo **„Veiksminga apsauga“** sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą. Vartojimas: balzamą tepkite ant lūpų ir nosies pagal poreikį. Rekomenduojama naudoti kaip pagalbinę apsaugos priemonę susibūrimuose.

*Maisto papildai**

-40%



SAULĖS VITAMINAS, kramtomosios tabletės N30

*Maisto papildas**

Patrauklios mėšukučių formos, obuolių skonio kramtomosios tabletės vaikams. Be saldiklių. Šis vitaminų D ir C derinys ypatingas tuo, kad vitaminas D yra apgaubtas liposoma, todėl organizmas lengviau ir efektyviau pasisavina. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią imuninės sistemos veiklą bei dantų, kaulų ir raumenų būklę.

STIPRIOS AKYTĖS, kramtomosios tabletės N30

*Maisto papildas**

Mėšukučių formos, miško vaisių skonio kramtomosios tabletės. Be saldiklių. Sudėtyje praturtinta liuteinu ir zeaksantinu, kurie yra karotenoidai, svarbūs normaliai regėjimo funkcijai palaikyti. Normalią akių funkciją, kraujotaką bei vaizdo aiškumą padeda palaikyti mėlynių uogų ekstraktas.

-40%

SKANUS IR SVEIKAS SPRENDIMAS JŪSŲ IR MŪSŲ VAIKAMS!

RAUDONI SKRUOSTUKAI, kramtomosios tabletės N30

*Maisto papildas**

Patrauklios mėšukučių formos, apelsinų skonio kramtomosios tabletės. Be saldiklių. Tinka vaikams nuo 3 metų. Sudėtyje yra patentuota geležis – Lipofer®. Geležis yra apgaubta liposoma, todėl organizmo lengviau ir efektyviau pasisavina bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernešimą organizme. Vitaminas C gerina geležies absorbciją. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: vaikams nuo 3 metų – sukramtyti po 1 tabletę kartą per dieną.



-40%




KRIOMEGA+, kapsulės N30

*Maisto papildas**

Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstraktas, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose. Ypač aukštos kokybės krilių taukuose esančios EPR (eikozapentaeninės) ir DHR (dokozaheksaeninės) rūgštys padeda palaikyti širdies veiklą*, DHR rūgštys padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą*. Krilių taukų kapsules patogiu būdu vartoti: jos nepalieka nemalonaus poskonio ir yra kelis kartus mažesnės nei įprastų žuvų taukų kapsulės. Užtenka tik 1 kapsulės per dieną. *Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. **Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

-40%



VIRONOX SMEGENŲ RŪKAS, 14 paketėlių

Maisto papildas*

„VIRONOX“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. Nauji VIRONOX „Smegečių rūkas“ maisto papildas protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Haudonžiedžių pasiflorų žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią miego kokybę. Vartojimas: tik 1 paketėlis per dieną.

-40%

ATMINČIAI IR SMEGENŲ VEIKLAI



MEMORIL FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildas*

Subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-40%

GERAM POILSIUI - SILDUS MIEGAS



Linija „Saldus miegas“ – dviejų poveikių, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas. „Saldus miegas melatonininas“ preparate yra 1 mg melatonino. „Saldus miegas eliksyras“ malonaus karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Taip pat melatonininas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skaitmą pajutimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg melatonino prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą).

Maisto papildas*

LENGVAM NERIMUI MALŠINT IR MIEGUI PALENGVINTI



LILADOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14 arba N28

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Lilador 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilador yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaistiniams arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštosios kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesuskramtytą užsigeriant pakankamu skystu kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB „Berlín Chemie Menarini Baltic“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_V1_print

-40%



„ACOSSEDUM+“ – atnaujintos sudėties skystas maisto papildas vandens pagrindu (be etanolio) jautriai nervų sistemai. Sudėtyje esantis vaistinio valerijono ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę būseną bei atsparumą stresui. Normalią miego kokybę padeda palaikyti vaistinių ramunėlių ir tikrųjų levandų žiedų ekstraktai, o nervų sistemos veiklą – vitaminas B6. Šio preparato sudėties praturtinta rausvąja rodiola, kuri padeda palaikyti organizmo prisitaikymą. Tinka ir vaikams nuo 3 metų.

Maisto papildas*

-40%



VALIDOL Aconitum – jūsų gerai savijautai!

Maisto papildas*

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tablečių reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

931 €



LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N30

LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N60

1623 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

375 €

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės



Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites neparaukiama gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaisyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, distagią, vėmimą krauju ar mėlyną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas neparaukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pabėgusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidoogreliu nepatartinas. Kitų PPI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025-08-18.

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS ESPUMISANAS!



ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N25

304 €

ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N50

473 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklioji medžiaga: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40mg simetikonos. Espumisan vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenų, ultragarsu. Espumisan skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. Espumisan vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliai saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Espumisan. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. Dozavimas: kai dėl susikaupusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams ir suaugusiems, bei 6–14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3–4 kartus per parą. Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos rytą. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com Reklama paruosta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Esp_17_2023_V1_pharma

-40%



TALIJA S, 30 tablečių

Maisto papildas*

Subalansuotas augalinių medžiagų derinys. Kontroliuoti kūno svorį padeda gvaraninių pailinių ir kambodžinių garcinijų vaisių ekstraktai. Kambodžinių garcinijų ekstraktas padeda mažinti alkio jausmą ir kontroliuoti apetitą. Tikrųjų imbiery šaknų ekstraktas padeda palaikyti tonusą, energingumą ir mažinti nuovargį, o chromas – palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį, užgeriant stikline vandens.

-25%



CANTALIN® micro, 64 tabletės

Maisto papildas*

Papildo kasdienę mitybą mikronizuotais flavonoidais. Kiekvienoje CANTALIN® micro tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų: 450 mg diosmino ir 50 mg hesperidino. Tai augalinės medžiagos, išgaunamos daugiausia iš citrusinių vaisių. Mikronizacijos procesas – medžiagų susmulkimas iki labai mažų dalelių – pagerina jų įsisavinimą organizme. Vartojimas: suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną.

LIBIFEME® meno 50+, 30 tablečių

Maisto papildas*

LIBIFEME® meno 50+ yra maisto papildas, skirtas gerai moterų savijautai menopauzės metu ir po jos. Sudėtyje esantys bioaktyvūs fitoestrogenai – lignanai iš linų sėklų – padeda palaikyti normalią krūtų būklę bei normalią savijautą menopauzės metu. Vartojimas: suaugusioms moterims vartoti po 1 tabletę ryte, užgeriant nedideliu kiekiu (pavyzdžiui, puse stiklinės) vandens.

-40%

celluLESS, 60 kapsulių

Maisto papildas*

Paragvajinių bugienių lapų ekstrakto, L-karnitino ir konjuguotos linolo rūgšties derinys nukreiptas į pagrindines celiulito susidarymo priežastis. Paragvajinių bugienių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalų kūno svorį ir normalią riebalų apykaitą.

migraLESS, 60 kapsulių

Maisto papildas*

Atsipalaidavimui. Vaistinių skaistenų žiedų ekstraktas padeda atsipalaiduoti. Nervų sistemai. Grifonijų sėklų milteliai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Psichologinei funkcijai. Magnis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.



-30%

GAMTOS ĮKVĖPTI
MINERALAI IŠ IZRAELIO!



Magnis ir kalis - gyvybiškai svarbūs mineralai tavo organizmui

Maisto papildai*

Sudėtyje – tik grynai magnio, kalio citratai! Be saldiklių, konservantų ir dažiklių, išgaunami iš Nėgvosios jūros. Magnis – ramybės ir stiprybės šaltinis. Padeda palaikyti normalų raumenų susitraukimą ir nervinių impulsų padavimą. Dalyvauja ląstelių energijos apykaitoje, todėl padeda mažinti nuovargį. Svarbus kovojant su stresu, nerimu ir nemiga. Kalis – širdies ir skysčių pusiausvyros sergėtojas. Palaiko normalų širdies ritmą ir padeda reguliuoti kraujospūdį. Būtinai normaliam raumenų susitraukimui ir nervinių signalų perdavimui.

1+1



Sport & Cardio – milteliai elektrolitų tirpalui ruošti su gudobelėmis ir L-glicinu. **Sport&Hydro+** – reikalingiausių elektrolitų kompleksas su hialuro rūgštimi energijos balansui palaikyti. **Sport & Joints** – elektrolitai su kalciumu ir gliukozaminu. **Sport & Basic** – šarminiai elektrolitai su vitaminu C! **Sport&Isotonic** – bene vienintelis isotoninis produktas su augalų ekstraktais, atstatantis prarastus elektrolitus, mikroelementus, vitaminus ir energiją, saugant svarbiausią organą – širdį. Elektrolitų tirpalai padeda papildyti organizmą reikalingomis medžiagomis (magniu, kalciumu, natriu, cinku ir kt.). **Sport&Creatine** – kreatino, gudobelės ekstrakto ir vitamino B1 kompleksas, sukurtas didinti fizinį pajėgumą ir saugoti širdį. **Sport&Protein** – kolageno, pieno baltymų, magnio ir vitamino C kompleksas raumenų masei auginti ir išlaikyti, kremzlės ir odai. **Sport&Amino W.H.O** – bene vienintelis net 8 amino rūgščių kompleksas su folio rūgštimi. Sudėtyje – tik aktyvios medžiagos! Be konservantų, be stabilizatorių, be dirbtinių saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

Maisto papildai*

1+1

KRAUJOTAKAI, ŠIRDŽIAI,
KRAUJOSPŪDŽIUI IR
KRAUJUI GERINTI



„**bioKalis 400 mg**“ ir „**bioKalis forte**“ sudėtyje – grynas kalio citratas miltelių pavidalu. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą.

„**COR4 Complex**“ – subalansuota širdžiai, kraujotakos sistemai ir cholesteroliui su didžiausiu gudobelės žiedų ekstraktu Lietuvoje. Mineralai kalis ir magnis, vitaminas B1 ir augalinės kilmės medžiagos (gudobelė, pluoštinė bosvelija, ciberžolė, dirvinis asiūklis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje, gerina kraujotaką ir kraujotaką. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

Maisto papildai*

-40%



KALICORD 850

Maisto papildas*

Sudėtyje yra 850 mg kalio citrato, kuris papildo organizmą trūkstamam kalio kiekiui. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir normalią raumenų veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

SAŃARIAMS, JUNGIAMAJAM AUDINIUI, ENERGIJAI,
KĖPENIMS, VIRŠKINIMUI, IMUNITETUI!



DIAS® Forte – didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas – „Collagen Quattro Complex™“ – sąnariams, kaulams, kremzlėms, dantims, dantenoms ir odai. Malonaus granatų ar greipfrutų skonio. 1 pakėtyje – daugiau kaip 10 000 mg kolageno! **DIAS® Collagen liquid** – hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, vitaminų ir mineralų derinys su bioaktyviais prekės ženklo „Peptan®“ kolageno peptidais kaulams, kremzlėms, raumenims, jungiamajam audiniui, normaliai energijos apykaitai ir imuninės sistemos veiklai. 1 pakėtyje (paros dozė) – net 3900 mg II tipo kolageno!

DIAS® Detox – itin koncentruotų augalinių ekstraktų kompleksas su augaliniais fermentais, vitaminais ir mineralais. Kepenims, virškinimui ir imunitetui.

MAGLIQUID – skystos formos magnio citratas 815 mg. Lengvai įsisavinama magnio forma raumenims, kaulams, energijai, nervų sistemai, jungiamajam audiniui. Malonaus skonio, be B grupės vitaminų, tinkamas vaikams nuo 6 metų amžiaus.

Maisto papildai*

-30%

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA
APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES
ODAI!

RELIZEMA spray&go – zinc + panthenol purškalo 100 ml
RELIZEMA baby care kremas 100 ml

Kosmetikos priemonės

Produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskėlinių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.

RELIZEMA™ spray&go - zinc + panthenol purškalo - be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.

RELIZEMA™ priemonės rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskėlinę arba tada, kada reikia.

Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16a, LT-03163 Vilnius, Lithuania



VAISTINIŲ KONTAKTAI

 VILNIUS Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642 Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520	 GIRKALNIS Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523 Raseinių raj.
 KAUNAS V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826	 GRINKIŠKIS Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388 Radviliškio raj.
 MASTAIČIAI Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144 Kauno raj.	 GRĮŠKABŪDIS Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266 Šakių raj.
 KLAIPĖDA Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914	 JONIŠKĖLIS Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219 Pasvalio raj.
 ŠIAULIAI Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879	 KAIŠIADORYS Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745
 ALYTUS Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088	 KRUONIS Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106 Kaišiadorių raj.
 BUTRIMONYS Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244 Alytaus raj.	 SASNAVA Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511 Marijampolės raj.
 MIROSLAVO K. Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587 Alytaus raj.	 SEIRIJAI Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939 Lazdijų raj.
 DRUSKININKAI Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008	 ŠAKIAI V. Kudirkos g. 48, tel. (0 345) 51 516
 ELEKTRĖNAI Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415	 UKMERGĖ Anykščių g. 21-51, tel. (0 340) 65 149
 ABROMIŠKIŲ K. Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310 Elektrėnų sav.	 VENTA Žemaičių g. 31-43, tel. (0 425) 30 447

Užsisakykite prekes internetu www.100metu.lt ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!

VAISTINĖS - PARTNERĖS



BALBIERIŠKIS

Prienų raj.

„Guobos vaistinė“

Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310

KĖDAINIAI

„Kaštonų vaistinė“

J. Basanavičiaus g. 10, tel. (0 347) 67 244

KURŠĖNAI

„Kuršėnų vaistinė“

Vytauto g. 5, tel. (0 415) 85 747

iki **-30%**



Platus **SENI** sueriamųjų produktų asortimentas skirtas žmonėms, kurie susiduria su šlapimo nelaikymu. **SENI CARE** specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie paženklinėti „Vegan“ ženkluku.

iki **-30%**



BELLA higieniniai paketai ir kasdieniniai įklotai - ploni, diskretiški, daug sugeriantys ir laidūs orui. Vatos gaminiai - iš 100% medvilnės.